Grille d'évaluation de la Douleur GED- DI (NCCPC) « modifiée » pour les TSA

	•	•				
Nom:	Date:					
Rempli par : Age :						
Avec:	ÉTAT de BASE ou	TROUB	LE DU	СОМРО	RTEME	NT
Période d'observation à définir pour chaque situation (d	lemi-journée, journée, sem	naine),	précis	er:		
Instruction pour la cotation 0 = non observé 1 = observé à l'occasion	2 = observé souvent mais pas de façon continuelle 3 = observé très souvent, presque continuellement NA = non applicable					
Gémit, se plaint, pleurniche faiblement		0	1	2	3	NA
Pleure (modérément)		0	1	2	3	NA
Crie / hurle (fortement)		0	1	2	3	NA
Ne collabore pas, grincheux, irritable,		0	1	2	3	NA
Interagit moins avec les autres, se retire		0	1	2	3	NA
Recherche le confort ou la proximité physique		0	1	2	3	NA
Est difficile à distraire ou apaiser		0	1	2	3	NA
Fronce les sourcils		0	1	2	3	NA
Changement dans les yeux : écarquillés, plissés, air renfrogné		0	1	2	3	NA
Auto agressivité		0	1	2	3	NA
Hétéro agressivité		0	1	2	3	NA
Fait la mou, lèvres fermées, frémissantes, maintenues proéminentes		0	1	2	3	NA
Serre les dents, grince des dents, se mord la langue ou tire la langue		0	1	2	3	NA
Ne bouge pas, est inactif ou silencieux		0	1	2	3	NA
Saute partout, est agité, ne tient pas en place		0	1	2	3	NA
Présente un faible tonus, est affalé		0	1	2	3	NA
Présente une rigidité motrice, est raide, tendu, spastique		0	1	2	3	NA
Montre par des gestes ou des touchers une partie du corps		0	1	2	3	NA
Tente de se soustraire au toucher (tout ou partie du corps)		0	1	2	3	NA
Frissonne		0	1	2	3	NA
La couleur de peau change et devient pale		0	1	2	3	NA
La couleur de peau change et il existe une hyper sudation		0	1	2	3	NA
Larmes visibles		0	1	2	3	NA
A le souffle court ou hyper ventile		0	1	2	3	NA
Retient sa respiration		0	1	2	3	NΔ

Score :

0

0

Contexte:

Dort plus ou dort moins

Mange moins, moins intéressé par la nourriture – Mange plus

1

1

2

2

3

3

NA

NA