Point sur les travaux en cours pour SII

Pr Jean-Marc SABATE

Service de-Gastroentérologie

AP-HP, Hôpital Avicenne, HUPSSD, Paris 7 Denis Diderot

INSERM U-987

Président du Conseil Scientifique de l' APSSII

Journée de l'APSSII 2018

Physiopathologie du SII

Mécanismes Périphériques

Mécanismes Centraux

≈50% Facteurs psycho-sociaux
stress, dépression, anxiété
abus sexuels

Anomalie dans le contrôle
de la douleur

Micro-inflammation
≈44%

Trouble de la motricité

66% Dysbiose, CBCG ?
acides biliaries ?

Hypersensibilité viscérale
66%

**Etude des rapports entre alimentation
et symptômes digestifs au cours du
Syndrome de l'Intestin Irritable
(Etude ALIMSI)**

Introduction

- Le syndrome de l'Intestin Irritable (SII) qui associe douleurs abdominales et troubles du transit touche 10% de la population en France.
- Bien que n'étant pas une maladie grave, le SII peut altérer la qualité de vie de manière importante, notamment dans les formes sévères.
- Dans la physiopathologie complexe du SII, l'alimentation joue un rôle chez 2/3 des patients, déclenchant ou aggravant des symptômes préexistants.

But de l'étude

- d'étudier chez les adhérents de l'APSSII:
 - les liens existants entre alimentation et symptômes au cours du SII basés sur déclaration
 - ainsi que l'attitude face aux régimes.
 - les liens entre repas et symptômes digestifs basé sur enregistrement des repas sur 4 jours des symptômes post-prandiaux:
 - Douleur abdominale
 - Ballonnements
 - Flatulence
 - Selles

Patients et Méthodes

- Les adhérents de l'Association des Patients Souffrant du SII (APSSII) ont été sollicités par mail pour participer à une enquête en ligne en octobre 2017.
- remplissage en ligne de questionnaire général sur la maladie, ses rapports avec l'alimentation et l'attitude face aux régimes.
- renseigner les symptômes digestifs (douleurs abdominales, ballonnements, flatulence et la survenue de selles après les repas) pendant 1 à 4 jours.

Résultats :

description des participants

- 84 adhérents ont été inclus (69 femmes (82,3%), âge moyen 46,9 $\pm$ 16 ans, IMC 21,7 $\pm$ 3,7 kg/m²)
 - et une durée d'évolution de 8,7 ans
 - SII-C 37,2% , SII-A 32,1% et SII-D 30,8%.
 - sévérité selon le score IBS-SSS :
 - minime (19%), moyenne (34%) et forme sévère (44%)
 - anxiété présente chez 51% (HAD-A $\geq$ 10) et une dépression chez 34% (HAD global $\geq$ 19)
 - qualité de vie altérée dans toutes ses dimensions:
 - IBS-QoL 53,9 $\pm$ 18.
 - coloscopie réalisée chez 87,2% des participants
 - 83% des patients avaient consulté pour le SII dans les 12 mois.

Résultats : lien avec alimentation (déclaratif) et attitude face aux régimes

- Pour 73% participants : alimentation à un rôle déclenchant
- Pour 93% un rôle aggravant des symptômes.
- Suivre un régime = considéré comme « difficile » pour 87% des participants.
- Avec par ordre de préférence pour suivre un régime :
 - diététicienne (77%), un médecin (62%), une liste d'aliments trouvé sur internet (60%), une application mobile (59%) et un livre (52%).
- Les régimes déjà testés par les participants étaient:
 - Sans gluten (pauvre en lactose (60%), pauvre en FODMAPs (52%), sans gluten (43%), riche en fibres (21%), basé sur des tests d'allergies (10,5%) et végétarien (9%).

Résultats : symptômes en lien avec alimentation (enregistrement repas 4 j)

- L'analyse des symptômes a été réalisée sur :
- 590 repas enregistrés pendant 1 à 4 jours par 59 patients (caractéristiques identiques au groupe global)
- 39% (IC95: 18%-59%) des repas généraient des symptômes (tous symptômes confondus)
 - sans différence selon les types de transit (SII-D: 34%, SII-C: 36% et SII-A: 50%)
 - mais plus souvent pour les formes de sévérité moyenne (45%) et pour les formes sévère (55%) par rapport aux formes avec sévérité minimale (15%) (ANOVA, $p = 0,001$).

Résultats : symptômes en lien avec alimentation (enregistrement repas 4 j)

- Les pourcentages de repas suivis de
 - douleurs abdominales (7%, 17%, 36%),
 - de ballonnement (7%, 29%, 29%)
 - ou de flatulence (4%, 35%, 29%)variaient avec la sévérité de la maladie (minime, moyenne sévère; ANOVA, $p < 0,05$), mais pas avec le sous-type de transit,
- le pourcentage de repas suivi de selles ne variait ni avec la sévérité (36%, 41%, 33%) ni avec le sous-type de transit (38%, 31% et 41%; respectivement pour SII-D, SII-C et SII-A).
- Analyse selon aliments consommés, complexe, en cours...

Prise en charge de la dysbiose associée au SII

Flore fécale SII vs sujets sains : analyse >1000 phylotypes intestinaux (HIT Chip)

SII-D 25
SII-C 18
SII-A 19
VS 46

➔ Vers un profil spécifique de flore chez les SII ?

Sous types de SII selon microbiote

- 37 patients SII (15 SII-D; 10 SII-C; 12 SII-A); 20 sujets sains (apparié age et sexe), etude QdV, sévérité, sensibilité rectale, TTC
- analyse microbiote pyrosequensage

15 / 37 SII = comme sujet sain

Microbiote anormal chez seulement 2/3 des patients

Faut-il rechercher une dysbiose pour la prendre en charge ?

- Quel test disponible hors recherche
- Quel coût ?

* Informations obligatoires à remplir en MAJUSCULE:

☐ Bilan total du microbiote intestinal 250€	☐ Bilan du microbiote intestinal + 165€
--	--

Profil micro-écologique, facteurs virulents de la flore intestinale, IgA sécrétoire, β -défensine 2, α 1-antitrypsine, Protéine éosinophile X (EPX), analyses de parasites (TFT)

Date de recueil* :
Tube 1 :/...../.....
Tube 2 :/...../.....
Tube 3 :/...../.....

Profil micro-écologique, facteurs virulents de la flore intestinale, IgA sécrétoire, β -défensine 2, α 1-antitrypsine, Protéine éosinophile X (EPX)

Date de recueil* :
Pot :/...../.....

* Echantillons à transmettre à température réfrigérée

➤ Règlement et accord du patient

Ce bilan est à la charge du patient, non remboursé par la Sécurité Sociale et doit être acquitté au moment du prélèvement.

Je soussigné(e)..... reconnais avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et donne mon accord pour effectuer le(s) bilan(s) prescrit(s) par mon médecin et accepte de régler le montant total au laboratoire préleveur.

Date :

Signature :

RCS: D 402 928 766 | Tél : (+33) 1 34 40 98 17

www.biopredix.com

FDE BIOPREDIX_FR Juin 2017

- Intérêt à titre individuel ?
 - Non démontré

Implication du microbiote dans physiopathologie du SII

Mécanismes Périphériques

Micro-inflammation perméabilité

Trouble de la motricité

Mécanismes Centraux

Facteurs psycho-sociaux stress, dépression, anxiété abus sexuels

Anomalie dans le contrôle de la douleur

Hypersensibilité viscérale

Dysbiose, CBCG acides biliaires

Traitements à impact sur le microbiote

Mécanismes Périphériques

Mécanismes Centraux

Facteurs psycho-sociaux
stress, dépression, anxiété
abus sexuels
Anomalie dans le contrôle
de la douleur

Micro-inflammation

Douleur

Trouble de la motricité

FMT ?
Rifaximine
Probiotiques
Flore

Hypersensibilité viscérale

**Régime pauvre
FODMAPs**

Pour l'instant ... Résultats des études non corrélés à un microbiote particulier

Mécanismes Périphériques

Micro-inflammation

Trouble de la motricité

← Crampes abdominales →

Mécanismes Centraux

Facteurs psycho-sociaux
stress, dépression, anxiété
abus sexuels
Anomalie dans le contrôle
de la douleur

Douleur

FMT ?
Rifaximine
Probiotiques
Flore

Hypersensibilité viscérale

**Régime pauvre
FODMAPs**

Prise en charge de la dysbiose
via la transplantation de
microbiote fécal

Définition-mécanismes

- FMT : fecal microbiota transplantation
- Administration de selles (contenant le microbiote complet) d' un individu sain pour promouvoir la colonisation du receveur avec une flore à effet bénéfique.
- Mécanismes pour l' infection à *Clostridium difficile* :
 - Restauration de la diversité des micro-organismes, des anaérobies et des bactéries produisant du butyrate

Popularité !

YouTube FR

Rechercher

DIY Fecal Transplants to cure yourself of Ulcerative Colitis

93 647 vues

467 34 PARTAGER

Michael Hurst

Ajoutée le 4 juin 2013

S'ABONNER 366

This video shows you how to do Fecal Microbiota Transplants (FMT) at home. While this video goes into a lot of detail there are other elements to make this treatment safe and effective that I cover in more detail in my book: <http://fecaltransplant.org/fecal-tran...>

À suivre

LECTURE AUTOMATIQUE

How Fecal Transplants Can Save Lives

Stories
142 k vues

Fecal microbial transplantati

VideoGIE Journal
2,8 k vues

Fecal Matter Transplant FMT Bacteriotherapy 02/10/2017

Neuroimmune Disease Treatm
1,7 k vues

Fecal transplants & why you should give a crap | Mark Da

TEDx Talks
27 k vues

Dr. Perlmutter: Brain Maker, Fecal Transplants, and How

Abel James
53 k vues

Les Dethlefsen: Fecal Transplant Pills, The Microbi

Bulletproof
9,6 k vues

Fecal Microbiota Transplant: Science & do it yourself

Matériel à administrer

- selles « fraîches » (administrées < 6 heures) suivant leur émission)
- environ 50 à 100g
 - homogénéisées et filtrées
 - mises en suspension dans du sérum physiologique.
 - Environ 300ml de la solution reconstituée sont administrés
- Selles congelées à l' état frais¹
 - conservée à -80° C
 - Décongélation lente avant réadministration
 - Efficacité équivalente à selles fraîches pour CDI

¹*Hamilton et al. Am J Gastroenterol 2012*

Voies et site d'administration

- Voies :
 - Sonde Nasogastrique, Naso-Jejunale, pendant FOGD (grêle proximal)
 - Pendant Coloscopie (iléon et/ou colon droit)
 - Lavement (atteint l'angle gauche)
- Equivalentes ?
 - Sonde NG semble moins efficace pour CDI/coloscopie : 76-79% vs 91%

FMT et SII : Données de la littérature

- Etudes non randomisée
- SII-D surtout

Study (year, country, ref)	Type of patients	Number of patients	Route of delivery	Follow up (month)	Effect
Borody (Australia, 1989)[52]	IBD and IBS (C, D ?)	55	Enema	1-12	Cure 9 (36%) Symptom relief 9 (16%) No response 26 (47%)
Pinn (USA, 2013) [53]	IBS-D (9), IBS-C (3), IBS-M (1)	13	Esophago-duodenoscopy	6-18	Symptom relief 9 (69%) No response 4 (31%) Improved QoL in 46%
Holvoet (Belgium, 2014)	IBS with bloating	12 (8 of 12)	colonoscopy	3 12	Symptom relief 9 (75%) No response (25%) Symptom relief 7 (87,5%) Relapse 1(12,5%)

- Effet propre compte tenu effet placebo (40-50%)?

Borody et al. Med J Aust 1989

Pinn et al. Am J Gastroenterol 2014

Holvoet et al. JFHOD 2015

FMT et SII : Etudes en cours

Source NIH.gov

Study (year, country, ref)	Type of patients /study	Number of patients	Type of FMT / route of administration	Follow up (month)	Primary objective
Brummer (Örebro University, Sweden, 2014) NCT02092402	IBS without high proportion of butyrate-producing microbiota in fecal samples Randomized: allogenic (healthy donors) vs own stool	? 16 included	Fresh stool Colonoscopy caecum	6	Symptoms (GSRS-IBS) at 6 months
Rasmus Goll , University Hospital of North Norway (Norway) NCT02154867	IBS-D Randomized allogenic (healthy donors) vs own stool 15 healthy donors	60 (30 vs 30)	Fresh stool Colonoscopy : proximal colon	12	Change in subjective symptom score (0 and 3 months) IBS-SSS before and after fecal transplantation
De Looze (Ghent, Belgium, 2014) NCT02299973	IBS with bloating Randomized allogenic (healthy donors) vs own stool	??	Frozen stool Colonoscopy : ileum and proximal colon	12	Reduction of overall IBS symptoms at 3 months Reduction of IBS bloating at 3 months

Etude Négative
DDW 2017

Faecal microbiota transplantation versus placebo for moderate-to-severe irritable bowel syndrome: a double-blind, randomised, placebo-controlled, parallel-group, single-centre trial

Peter Holger Johnsen, Frank Hilpüsch, Jorunn Pauline Cavanagh, Ingrid Sande Leikanger, Caroline Kolstad, Per Christian Valle, Rasmus Goll

Summary

Background Irritable bowel syndrome (IBS) is a common condition characterised by abdominal pain, bloating, and poor quality of life. IBS might be caused by a gut dysbiosis. We aimed to compare faecal microbiota transplantation (FMT) with placebo in patients with IBS.

Methods In this double-blind, randomised, placebo-controlled, parallel-group, single-centre study, we enrolled patients with IBS with diarrhoea or with diarrhoea and constipation (excluding dominating constipation) defined by the ROME III criteria, scored as moderate to severe according to the IBS severity scoring system (IBS-SSS; a score of ≥ 175). Eligible participants were aged 18–75 years and were recruited locally by general practitioners in northern Norway. We randomly assigned participants (2:1) in blocks of six to active or placebo FMT. Personnel not involved in the clinical performance of the trial generated the randomisation sequence using a randomisation website. Non-study personnel performed the final allocation and standardised the active and placebo transplants to make them identical in appearance and temperature. The faeces were freshly processed, and were used the same day (fresh transplant) or were stored in a freezer for later use (frozen transplant); participants' own faeces served as placebo. A dose of 8 mg loperamide was administered orally 2 h before endoscopy to retain the transplant. The transplant (50–80 g of faeces mixed with 200 mL of isotonic saline and 50 mL of 85% glycerol) was administered by a colonoscope to the caecum. The primary endpoint was symptom relief of more than 75 points assessed by IBS-SSS, 3 months after FMT. The primary analysis was done in the modified intention-to-treat population, excluding participants who did not undergo treatment or who were diagnosed with any other disease by pinch biopsies obtained during the treatment procedure. For the safety analysis, only participants who did not undergo treatment were excluded. The study is registered with

Lancet Gastroenterol Hepatol
2017

Published Online
October 31, 2017
[http://dx.doi.org/10.1016/S2468-1253\(17\)30338-2](http://dx.doi.org/10.1016/S2468-1253(17)30338-2)

See Online/Comment
[http://dx.doi.org/10.1016/S2468-1253\(17\)30337-0](http://dx.doi.org/10.1016/S2468-1253(17)30337-0)

University Hospital of North Norway Harstad, Harstad, Norway (P H Johnsen MD, I S Leikanger MSc, P C Valle PhD); Sjøkanten Legesenter, Harstad, Norway (F Hilpüsch MD); University Hospital of North Norway Tromsø, Tromsø, Norway (J P Cavanagh PhD, R Goll PhD); Norwegian Centre of Rural Medicine, UIT Arctic University of Norway, Tromsø, Norway (F Hilpüsch); and UIT

Figure 1: Trial profile

FMT vs placebo

Etude randomisée, selles fraîches ou congelées

- 90 patients SII, IBS-SSS ≥ 175 (sévérité moyenne à sévère),
- 60 FMT; 30 placebo (selles du patient réadministrées)
- 50-90 g de selles, par coloscopie dans caecum, (avec imodium)
- objectif principal : $\downarrow$ IBS-SSS > 75 points à 3 mois

Avant traitement

	Placebo (n=28)	Active (n=55)
Age (years)	45 (34 to 57)	44 (33 to 54)
Sex		
Women	19 (68%)	36 (65%)
Men	9 (32%)	19 (35%)
IBS subtype		
IBS with diarrhoea and constipation (mixed)	15 (54%)	24 (44%)
IBS with diarrhoea only	13 (46%)	31 (56%)
Time with IBS (years)	10 (6 to 16)	10 (5 to 19)
IBS-SSS at inclusion	278 (223 to 254)	260 (226 to 313)
Functional disorder comorbidity*	9 (32%)	14 (25%)
Total FODMAP before FMT (g/day)†	0.0 (-4.0 to 4.7)	0.0 (-6.9 to 4.9)

Effets secondaires

	Active (n=57)	Placebo (n=30)
Soling of transplant	1	1
Self-limiting intermittent abdominal pain	1	2
Self-limiting nausea and vertigo	1	0
Data are n.		

Table 2: Adverse events

FMT 65 % vs 43% placebo à 3 mois (p=0.049)

Johnsen et al. Lancet Gastroenterol Hepatol 2017

Avenir proche ???

- Etude monocentrique, 20 patients, rechutes CDI
- Gélules avec selles congelées (stockage jusqu' à 250 j, -80° c et ré administré à -20° c): voie orale , (doubles gélules; 1,6 g/gel x 30) soit $\approx$ 48 g (gelule acid-resistanthypromellose capsules (DRCaps,Capsugel)
- pour les patients “comme des petits cubes de glace,”
- Efficacité semble identique pour CDI avec 1 (70%) ou 2 administrations (90% efficacité) / naso-gastrique ou coloscopie
- Semble moins rapide : 4 jours vs < 2 jours
- 4 donneurs : 20 patients traités
- Pas de complication à type vomissement, inhalation

ORIGINAL ARTICLE

Faecal microbiota transplantation alters gut microbiota in patients with irritable bowel syndrome: results from a randomised, double-blind placebo-controlled study

Sofie Ingdam Halkjær,¹ Alice Højer Christensen,² Bobby Zhao Sheng Lo,¹ Patrick Denis Browne,³ Stig Günther,² Lars Hestbjerg Hansen,³ Andreas Munk Petersen¹

► Additional material is published online only. To view, please visit the journal online (<http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2018-316434>).

¹Department of Gastroenterology, Copenhagen University Hospital Hvidovre, Copenhagen, Denmark

²Department of Gastroenterology, Aleris-Hamlet Hospitals Copenhagen, Soborg, Denmark

³Department of Environmental Science, Aarhus University, Aarhus, Denmark

Correspondence to

Dr Andreas Munk Petersen, Department of Gastroenterology, Copenhagen University Hospital Hvidovre, Copenhagen 2650, Denmark; Andreas.Munk.Petersen@regionh.dk

Received 14 March 2018

Revised 13 June 2018

Accepted 19 June 2018

ABSTRACT

Objective IBS is associated with an intestinal dysbiosis and faecal microbiota transplantation (FMT) has been hypothesised to have a positive effect in patients with IBS. We performed a randomised, double-blind placebo-controlled trial to investigate if FMT resulted in an altered gut microbiota and improvement in clinical outcome in patients with IBS.

Design We performed this study in 52 adult patients with moderate-to-severe IBS. At the screening visit, clinical history and symptoms were assessed and faecal samples were collected. Patients were randomised to FMT or placebo capsules for 12 days and followed for 6 months. Study visits were performed at baseline, 1, 3 and 6 months, where patients were asked to register their symptoms using the IBS-severity scoring system (IBS-SSS) and IBS-specific quality of life (IBS-QoL). Prior to each visit, faecal samples were collected.

Results A significant difference in improvement in IBS-SSS score was observed 3 months after treatment ($p=0.012$) favouring placebo. This was similar for IBS-QoL data after 3 months ($p=0.003$) favouring placebo. Patients receiving FMT capsules had an increase in faecal microbial biodiversity while placebos did not.

Conclusion In this randomised double-blinded placebo-controlled study, we found that FMT changed gut microbiota in patients with IBS. But patients in the placebo group experienced greater symptom relief compared with the FMT group after 3 months. Altering the gut microbiota is not enough to obtain clinical improvement in IBS. However, different study designs and larger studies are required to examine the role of FMT in IBS.

Trial registration number NCT02788071.

Significance of this study

What is already known on this subject?

- The gut microbiota in some subgroups of patients with IBS is different from healthy controls.
- In *Clostridium difficile* infections, faecal microbiota transplantation (FMT) has shown excellent effects.

What are the new findings?

- This is the first large randomised controlled trial assessing the efficacy and safety of FMT in IBS with data on changes in the gut microbiota.
- FMT can change the gut microbiota in patients with IBS, but has less effect on symptoms and quality of life compared with placebo.

How might it impact on clinical practice in the foreseeable future?

- This study does not show evidence for effective treatment of IBS with FMT, despite long-term changes in gut microbiota after FMT was shown in these patients.
- More research regarding the effect of FMT in IBS subgroups is needed before the real impact of FMT in IBS is known.

diarrhoea-predominant, constipation-predominant or mixed type.¹

Many theories have been put forward but the exact cause of IBS is still uncertain. The complexity and diversity of IBS presentation makes treatment

FMT vs placebo

Etude randomisée, selles fraîches ou congelées

- 52 patients SII, IBS-SSS $\geq$ 175 (sévérité moyenne à sévère),
- FMT 25 gelules (12 g) x 12 jours, ou placebo (gélules vides)
- $\pm$ 150 g de selles, etude à 1 , 3, 6 mois
- objectif principal : $\downarrow$ IBS-SSS $>$ 75 points à 3 mois; QdV

Table 1 Baseline characteristics of patients

	Overall	FMT	Placebo	P values
n	51	25	26	
Age (mean (SD))	36.39 (11.47)	37.28 (12.48)	35.54 (10.58)	0.593
Weight (mean (SD))	77.02 (17.86)	76.60 (19.89)	77.42 (16.07)	0.872
BMI (mean (SD))	25.99 (5.35)	25.96 (5.84)	26.02 (4.95)	0.966
Height (mean (SD))	1.72 (0.08)	1.72 (0.09)	1.72 (0.07)	0.784
Male (%)	16 (31.4)	8 (32.0)	8 (30.8)	1
Type of IBS (%)				0.591
IBS with constipation	17 (33.3)	7 (28.0)	10 (38.5)	
IBS with diarrhoea	15 (29.4)	7 (28.0)	8 (30.8)	
IBS-QoL score at inclusion (mean (SD))	41.07 (14.98)	42.07 (14.75)	40.11 (15.42)	0.646
IBS-SSS score at inclusion (mean (SD))	343.39 (86.61)	341.68 (95.02)	345.04 (79.56)	0.892

FMT vs placebo

Etude randomisée, selles fraîches ou congelées

- 52 patients SII, IBS-SSS ≥ 175 (sévérité moyenne à sévère),
- FMT 25 gelules (12 g) x 12 jours, ou placebo (gélules vides)
- objectif principal : $\downarrow$ IBS-SSS > 75 points à 3 mois;

FMT vs placebo

Etude randomisée, selles fraîches ou congelées

Table 3 Side effects in the FMT and placebo group.

	Overall	FMT	Placebo	P values
n	52	26	26	
Any side effects (%)	37 (71.15)	22 (84.6)	15 (57.7)	0.07
Stomach ache (%)	12 (23.1)	7 (26.9)	5 (19.2)	0.74
Nausea (%)	16 (30.8)	9 (34.6)	7 (26.9)	0.76
Headache (%)	6 (11.5)	3 (11.5)	3 (11.5)	1
Fatigue (%)	5 (9.6)	1 (3.8)	4 (15.4)	0.35
Dizziness (%)	2 (3.8)	2 (7.7)	0 (0.0)	0.47
Bloating (%)	6 (11.5)	5 (19.2)	1 (3.8)	0.19
Flatulence (%)	4 (7.7)	3 (11.5)	1 (3.8)	0.60
Diarrhoea (%)	6 (11.5)	6 (23.1)	0 (0.0)	0.03*
Mucus in the stool (%)	1 (1.9)	0 (0.0)	1 (3.8)	1
Obstipation (%)	3 (5.8)	3 (11.5)	0 (0.0)	0.23
Reflux (%)	5 (9.6)	2 (7.7)	3 (11.5)	1
Rash (%)	3 (5.8)	1 (3.8)	2 (7.7)	1
Vomiting (%)	1 (1.9)	1 (3.8)	0 (0.0)	1
Fever sensation (%)	10 (19.2)	5 (19.2)	5 (19.2)	1
Chest pain (%)	1 (1.9)	0 (0.0)	1 (3.8)	1
Fever (%)	2 (3.8)	2 (7.7)	0 (0.0)	0.47
Influenza symptoms (%)	1 (1.9)	1 (3.8)	0 (0.0)	1
Increased bowel movement (%)	2 (3.8)	2 (7.7)	0 (0.0)	0.47
Uncomfortable (%)	2 (3.8)	2 (7.7)	0 (0.0)	0.47

*Bold indicates statistical significance, $p < 0.05$.

FMT, faecal microbiota transplantation.

α diversité

FMT vs placebo

Etude randomisée, selles fraîches ou congelées

FMT et SII ...

- FMT est un traitement d'efficacité démontrée notamment au cours de l'infection à *Clostridium difficile*
- Mise en place complexe du fait impératifs réglementaire (sécurité) et organisation (selles fraîches, sélection donneurs)
- Le SII dans ses formes sévères réfractaire pourrait être une indication

Questions non résolues

- Efficacité propre au delà de l'effet placebo
 - Résultat des études randomisées
 - Selon sous-groupes (transit, enterotype du patient)
- Taux et durée implantation au cours du SII
 - et différence selon le type de transit
- Acceptabilité comme traitement si répété
- Mécanismes d'action ?

Perspectives

- Si démonstration de l'efficacité de la FMT comme option thérapeutique pour les formes réfractaires
- Augmentation de la simplicité et l'efficacité de l'organisation :
 - Selles congelées : 1 donneur pour plusieurs dons
- Banques de selles (OpenBiome, Cambridge, MA)
- Développement de selles « synthétiques »